

SmPC Entyvio® 300 mg. SmPC Entyvio® 108 mg.
IV: intraveneus; SC: subcutaan.




Entyvio®: Doseringsschema voor colitis ulcerosa patiënten

IV Na 3 inductiedosissen, onderhoudsbehandeling met IV om de 8 weken



SC Na 2 of 3 inductiedosissen, SC onderhoudsbehandeling om de 2 weken




SmPC Entyvio® 300 mg. SmPC Entyvio® 108 mg.
UC: ulcerative colitis; SC : subcutaan; IV: intraveneus.





Entyvio®: Doseringsschema voor patiënten met de ziekte van Crohn

IV Na 3 of 4 inductiedosissen, IV onderhoudsbehandeling om de 8 weken



SC Na 2, 3 of 4 inductiedosissen, SC onderhoudsbehandeling om de 2 weken




CD: Crohn's disease; SC : subcutaan; IV: intraveneus.

Optimalisatie van de behandeling met Entyvio® bij verlies van respons


GEMINI 1 & 2 – GEMINI OLE TRIAL

Evaluatie van dosisescalatie van Q8W naar Q4W bij patiënten die zich vroegtijdig terugtrokken uit GEMINI 1 & 2 vanwege verlies van respons op een Q8W schema en die werden geïncludeerd in de GEMINI OLE studie.

Hieruit bleek dat overschakelen naar een Q4W schema **nuttig kan zijn als ‘reddingsbehandeling’** voor sommige patiënten die niet meer reageren op een Q8W schema.



Onder patiënten die vroegtijdig werden teruggetrokken uit **GEMINI 1** vanwege verlies van respons op een Q8W schema, werd **klinische respons[#]** gemeld bij **53%** van de patiënten en **klinische remissie^{##}** bij **25%** van de patiënten op week 28 na overschakeling naar Q4W schema¹.



Onder patiënten die vroegtijdig werden teruggetrokken uit **GEMINI 2** vanwege verlies van respons op een Q8W schema, werd **klinische respons[°]** gemeld bij **54%** van de patiënten en **klinische remissie^{°°}** bij **23%** van de patiënten op week 28 na overschakeling naar Q4W schema².

1. E.V. Loftus & al Journal of Crohn's and Colitis, 2017, Apr 1;11(4) 400–411
2. S Vermeire et al Journal of Crohn's and Colitis, 2017 April 1;11(4): 412–424
[§] Clinical response: reduction of ≥ 2 points and ≥ 25% from the baseline partial Mayo score with decrease in rectal bleeding subscore of ≥ 1 point or an absolute rectal bleeding subscore of ≤ 1 point.
^{##} Clinical remission: partial Mayo score of ≤ 2 with no individual subscore of > 1.
[°] Clinical response: ≥3-point decrease from baseline in Harvey Bradshaw Index score.
^{°°} Clinical remission: Harvey Bradshaw Index score ≤ 4.